NL (Nederlands)

BEOOGD DOEL: Cavex ImpreSafe is een concentraat voor het desinfecteren en reinigen van gebitsafdrukken gemaakt van alginaat, polyether, polysulfide, A-siliconen en C-siliconen. Cavex ImpreSafe heeft geen invloed op de maatvastheid van gebitsafdrukken. Vrij van aldehyden.

BEOOGDE GEBRUIKERS: Het product is bedoeld voor gebruik door tandheelkundige of zorgverlengers met kennis over de desinfectie van medische hulpmiddelen. Het product mag niet rechtstreeks bij patiënten worden gebruikt.

WERKINGSSPECTRUM: Bakteriedodend (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% pa 3 min; gisteodend (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% pa 3 min; kapselkende virussen (EN 17111:2018^) 3% pa 3 min

^ Testet under lav organisk belastning / * Testet under hoy organisk belastning / ^ Testet under lav og hoy organisk belastning

^ Getest onder lage organische belasting / * Getest onder hoge organische belasting

GEBRUIKSAANWIJZING: Draag voor uw bescherming wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril. Bereid de werkoplossing voor volgens de doseringstabel. Dompel de gebitsafdruk en afdrukschaal volledig onder in de desinfecterende oplossing. Houd u aan de aangegeven contacttijd, maar overschrijd deze niet. Na desinfectie de afdrukken gedurende 10 seconden grondig onder stromend water van minstens drinkkwaliteit spoelen. Verwang de werkoplossing dagelijks of wanneer deze zichtbaar verontreinigd is. Een lijst met compatibele en incompatibele materialen is beschikbaar op onze website. Als u twijfelt over de materiaalsamenstelling van het medische hulpmiddel, neem dan voor gebruik contact op met de fabrikant. Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.

BEPERKINGEN: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Niet voor gebruik op invasieve medische apparaten. Niet vermengen met andere producten. Zorg ervoor dat alle zichtbare vervuiling is verwijderd voordat u gaat desinfecteren.

BEHANDELING: H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig met relevante verordeningen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website.

OPSLAG: Opslaan in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd direct zonlicht, hitte en open vuur. Bewaartemperatuur: < 30ºC

SAMENSTELLING: 100 g bevat 30 g benzalkoniumchloride, hulpstoffen en water.

NO (Norsk)

TILTENKT FORMÅL: Cavex ImpreSafe er et konsentrat for desinfektering og rengjøring av tannavtrykk laget av alginat, polyeter, polysulfid, A-silikon og C-silikon. Cavex ImpreSafe påvirker ikke dimensjonsstabiliteten til tannavtrykk. Uten aldehyder.

TILTENKTE BRUKERE: Produktet er ment for bruk av tannleger eller helsepersonell med kunnskap om desinfisering av medisinsk utstyr. Produktet skal ikke brukes direkte på pasienter.

EFFEKTIVT SPEKTRUM: Bakteriedrepende (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% på 3 min; gjærdrepende (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% på 3 min; kappekledde virus (EN 17111:2018^) 3% på 3 min

^ Testet under lav organisk belastning / * Testet under hoy organisk belastning / ^ Testet under lav og hoy organisk belastning

^ Getest under lage organische belasting / * Getest under hoge organische belasting

GEBRUIKSAANWIJZING: Draag voor uw bescherming wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril. Bereid de werkoplossing voor volgens de doseringstabel. Dompel de gebitsafdruk en afdrukschaal volledig onder in de desinfecterende oplossing. Houd u aan de aangegeven contacttijd, maar overschrijd deze niet. Na desinfectie de afdrukken gedurende 10 seconden grondig onder stromend water van minstens drinkkwaliteit spoelen. Vervang de werkoplossing dagelijks of wanneer deze zichtbaar verontreinigd is. Een lijst met compatibele en incompatibele materialen is beschikbaar op onze website. Als u twijfelt over de materiaalsamenstelling van het medische hulpmiddel, neem dan voor gebruik contact op met de fabrikant. Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.

BEPERKINGEN: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Niet voor gebruik op invasieve medische apparaten. Niet vermengen met andere producten. Zorg ervoor dat alle zichtbare vervuiling is verwijderd voordat u gaat desinfecteren.

BEHANDELING: H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig met relevante verordeningen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website.

OPSLAG: Opslaan in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd direct zonlicht, hitte en open vuur. Bewaartemperatuur: < 30ºC

SAMENSTELLING: 100 g bevat 30 g benzalkoniumchloride, hulpstoffen en water.

PT (Português)

FINALIDADE PREVISTA: Cavex ImpreSafe é um concentrado para desinfeção e limpeza de moldes dentários feitos de alginato, poliéter, polissulfureto, silicone A e silicone C.Cavex ImpreSafe não afeta a estabilidade dimensional das moldes dentários. Sem aldeídos.

UTILIZADORES PREVISTOS: O produto destina-se a ser utilizado por profissionais dentários ou de saúde com conhecimentos sobre o processo de desinfeção de dispositivos médicos. O produto não se destina a utilização direta no paciente.

ESPECTRO EFICAZ: Bactericida (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% em 3 min.; levaduricida (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% em 3 min.; vírus envelopados (EN 17111:2018^) 3% em 3 min.

^ Testado sob carga orgânica baixa / * Testado sob carga orgânica elevada / ^ Testado sob carga orgânica baixa e elevada

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Para sua proteção, use luvas descartáveis e óculos de segurança. Prepare a solução de trabalho de acordo com a tabela de dosagem. Imergir completamente o molde dentário e a moldeira na solução desinfetante. Respeitar mas não exceder o tempo de contacto indicado. Após a desinfeção, enxaguar bem os moldes sob água corrente de qualidade pelo menos potável durante pelo menos 10 segundos. Substituir a solução de trabalho diariamente ou quando visivelmente contaminada. Está disponível no nosso site uma lista de materiais compatíveis e incompatíveis. Em caso de dúvida quanto à composição do material do dispositivo médico, contacte o fabricante antes de o utilizar. Qualquer incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

LIMITAÇÕES: APENAS PARA USO PROFISSIONAL. Não deve ser usado em dispositivos médicos invasivos. Não misturar com outros produtos. Certifique-se de que toda a sujidade visível foi removida antes da desinfeção.

MANUSEAMENTO: H302 Nocivo por ingestão. H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso tenha mal-estar, ligar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retirá-las, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P501 Descartar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança disponível no nosso site.

ARMAZENAMENTO: Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. Manter afastado da luz solar directa, do calor e da chama aberta. Temperatura de armazenamento: <30 ºC

COMPOSIÇÃO: 100 g contém 30 g de cloreto de benzalcónio, auxiliares e água.

RU (Русский)

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: Cavex ImpreSafe представляет собой концентрат для дезинфекции и очистки зубных слепков из альгината, полиэфира, полисульфида, А-силикона и С-силикона. Cavex ImpreSafe не влияет на стабильность формы зубных слепков. Не содержит альдегидов.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Продукт предназначен для использования стоматологами и медицинским персоналом, обладающим знаниями о в области дезинфекции медицинских изделий. Продукт не используется непосредственно на пациентах.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ: Бактерицидный (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% за 3 мин.; противогрибковый (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% за 3 мин.; оболочковые вирусы (EN 17111:2018^) 3% за 3 мин.

^ Протестировано при низкой нагрузке по органическим загрязнениям / * Протестировано при высокой нагрузке по органическим загрязнениям / ^ Протестировано при низкой и высокой нагрузке по органическим загрязнениям

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: В целях безопасности надевайте одноразовые перчатки и защитные очки. Приготовьте рабочий раствор согласно таблице дозирования. Полностью погрузить зубной оттиск и оттискную ложку в дезинфицирующий раствор. Соблюдайте, но не превышайте указанное время воздействия. После дезинфекции тщательно промыть инструменты под проточной водой качества не ниже питьевой в течение 10 секунд. Меняйте рабочий раствор ежедневно или при видимом загрязнении. Список совместимых и несовместимых материалов доступен на нашем веб-сайте. Если вы не уверены в составе материала медицинского устройства, свяжитесь с производителем перед использованием. Обо всех серьезных случаях, возникающих в связи с медицинским изделием, следует сообщать изготовителю или в компетентные органы.

ОГРАНИЧЕНИЯ: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Не для использования на инвазивных медицинских устройствах. Не смешивать с другими продуктами. Перед дезинфекцией убедитесь, что все видимые загрязнения устранены.

ОБРАЩЕНИЕ: H302 Вредно при проглатывании. H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ средствами защиты лица. P301 + P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу в случае плохого самочувствия. P301 + P330 + P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть пораженные участки водой [или принять душ]. P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P501 Удалить содержимое/ контейнер в соответствии с местными/ национальными правилами. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом помещении. Беречь от прямых солнечных лучей, тепла и открытого огня. Температура хранения: <30 °C

СОДЕРЖАНИЕ: 100 г содержат 30 г хлорида бензалкония, вспомогательные вещества и воду.

SK (Slovenčina)

URČENÝ ÚČEL: Cavex ImpreSafe je koncentrát na dezinfekciu a čistenie zubných odtlačkov vyrobený z alginátu, polyéteru, polysulfidu, A-silikónu a C-silikónu. Cavex ImpreSafe neovplyvňuje tvarovú stálosť zubných odtlačkov. Neobsahuje aldehydy.

CIEĽOVÍ POUŽÍVATEĽIA: Produkt je určený na použitie odborníkmi v oblasti stomatológie a zdravotnej starostlivosti, ktorí majú poznatky o dezinfekcii zdravotníckych pomôcok. Prípravok sa nemá používať priamo na pacientoch.

SPEKTRUM ÚČINKU: Baktericídne (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% za 3 min; proti kvasinkám (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% za 3 min; obalené vírusy (EN 17111:2018^) 3% za 3 min

^ Testované pod nízkom organickom zaťažení / * Testované pri vysokom organickom zaťažení / * Testované pri nízkom a vysokom organickom zaťažení

NÁVOD NA POUŽITIE: Na vašu ochranu používajte jednorazové rukavice a ochranné okuliare. Pripravte pracovný roztok podľa tabuľky dávkovania. Ponorte zubný odtlačok a odtlačkovú lyžičku úplne do dezinfekčného roztoku. Dodržiavajte, ale neprekračujte uvedenú dobu kontaktu. Po dezinfekcii odtlačky dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou minimálne s kvalitou pitnej vody po dobu 10 sekúnd. Pracovný roztok vymieňajte každý deň alebo pri viditeľnom znečistení. Zoznam kompatibilných a nekompatibilných materiálov je k dispozícii na našej webovej stránke. Ak si nie ste istí materiálovým zložením zdravotníckeho výrobku, pred použitím sa obráťte na výrobcu. V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou by mal túto udalosť ohlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

OBMEDZENIA: IBA NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE. Nepoužívať na invazívnych zdravotníckych pomôckach. Nemiešať s inými produktami. Pred dezinfekciou dbajte na to, aby boli odstránené všetky viditeľné nečistoty.

MANIPULÁCIA: H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P312 PO POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izprajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Vsebino / embalažo zavrzite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Za več informacij glejte varnostni list, ki je na voljo na naši spletni strani.

SKLADIŠČENJE: Shranjujte v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru. Hranite zunaj neposredne sončne svetlobe, vročine in odprtega ognja. Temperatura skladiščenja: < 30 ºC

SESTAVA: 100 g vsebuje 30 g benzalkonijevega klorida, pomožna tekoča v vodo.

SR (Srpski)

NAMENA: Cavex ImpreSafe je koncentrat za dezinfekciju i čišćenje stomatoloških otisaka proizvedenih od alginata, polietera, polisulfida, A-silikona i C-silikona. Cavex ImpreSafe ne utiče na dimenzionu stabilnost zubnih otisaka. Ne sadrži aldehyde.

PREDVIDENI KORISNICI: Predviđeno je da proizvod koriste stomatološki ili zdravstveni radnici koji poseduju znanje o vrsti sa dezinfekcijom medicinskih uređaja. Proizvod se ne koristi direktno na pacijentima.

SPEKTAR DELOVANJA: Baktericidno (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% za 3 min; protiv kvasaca (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% za 3 min; virusi sa omotačem (EN 17111:2018^) 3% za 3 min

^ Testirano pod niskim stepenom organskog opterećenja / * Testirano pod visokim stepenom organskog opterećenja / ^ Testirano pod niskim i visokim stepenom organskog opterećenja

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Radi lične zaštite, nositi rukavice za jednokratnu upotrebu i zaštitne naočare. Pripremite radni rastvor u skladu sa tabelom za doziranje. Potpuno potopite otisak i posudu za otiske u dezinfekcioni rastvor. Pridržavajte se vremena delovanja, ali ga nemojte premašivati. Nakon dezinfekcije, otiske temeljno isperite tekućom vodom kvaliteta barem za piće u trajanju od 10 sekundi. Zamenite dezinfekcioni rastvor svaka dana ili kada je vidno kontaminiran Lista kompatibilnih i nekompatibilnih materijala je dostupna na našem web-sajtu. Ako niste sigurni u pogledu sastava materijala medicinskog sredstva, obratite se proizvođaču pre upotrebe. Sve ozbiljne incidente koji se dese sa medicinskim sredstvom treba prijaviti proizvođaču ili nadležnom organu.

OGRANIČENJA: ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU. Nije za upotrebu na invazivnim medicinskim sredstvima. Ne mešati sa drugim proizvodima. Uverite se da je sva vidna prljavština uklonjena pre dezinfekcije.

RUKOVANJE: H302 Štetno ako se proguta. H314 Izaziva teške opekotine na koži i oštećenje oka. H410 Veoma toksično za vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitnu masku za lice. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara ako se ne osećate dobro. P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne sočiva, ako postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P501 Odložiti u otpad sadržaj/ambalažu u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima. Više informacija potražite u bezbednosnom listu proizvoda koji je dostupan na našem veb-sajtu.

ČUVANJE: Čuvati u hladnom, suvom i dobro provetrenom objektu. Držati dalje od direktne sunčeve svetlosti, toplote i otvorenog plamena. Temperatura čuvanja: <30ºC

SASTAV: 100 g sadrži 30 g benzalkonijum hlorida, dodatne sastojke i vodu.

TH (ภาษาไทย)

วัตถุประสงค์ที่กำหนด: Cavex ImpreSafe เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับนำเข้าและทำความสะอาดแบบพิมพ์ฟันที่ผลิตจากแอลจิเนต โพลิเอเธอร์ โพลิซัลไฟด์ เอ-ซีลีโคน และซี-ซีลีโคน Cavex ImpreSafe ไม่ส่งผลต่อความคงรูปของแบบพิมพ์ฟัน ปราศจากแอลดีไฮด์

ผู้ใช้งานที่กำหนด: ผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านทันตกรรมหรือการดูแลสุขภาพที่มีความรู้เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงบนผู้ป่วย

ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์: ฆ่าเชื้อแบบคลีเชีย (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% ใน 3 น.; ฆ่าเชื้อยีสต์ (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% ใน 3 น.; ไวรัสประเภทมีเปลือกหุ้ม (EN 17111:2018^) 3% ใน 3 น.

^ ทดสอบภายใต้ผ้นทรัสสารอินทรีย์ต่ำ / * ทดสอบภายใต้ผ้นทรัสสารอินทรีย์สูง / ^ ทดสอบภายใต้ผ้นทรัสสารทั้งต่ำและสูง

คำแนะนำในการใช้: เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้สวมใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งและแว่นตานิรภัยกัน ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามตารางการผสม แช่แบบพิมพ์ฟันและถาดพิมพ์ฟันทั้งก้อนในน้ำยาฆ่าเชื้อ ปฏิบัติตามเวลาฆ่าเชื้อที่แนะนำ แต่ไม่เกินเวลาดังกล่าว หลังจากการฆ่าเชื้อ ล้างแบบพิมพ์ฟันให้ทั่วด้วยน้ำที่ไหลผ่านคุณภาพอย่างน้อยน้ำดื่มเป็นเวลา 10 วินาที เปลี่ยนน้ำยาสำหรับใช้งานทุกวัน หรือเมื่อพบว่าปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ทั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ชาร์จแรงที่เกิดขึ้นโดยมีการเปลี่ยนรูปทางกลไกงานพบที่ทั้งหมดควรรายงานต่อผู้ผลิต หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ข้อจำกัด: สำหรับการใช้งานในวิชาชีพทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามใช้กับเครื่องมือแพทย์ที่รุกล้ำเข้าร่างกาย ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น ควรวงสอบให้แน่ใจว่าน่าเศษฝ้นที่มองเห็นทั้งหมดออกก่อนทำการฆ่าเชื้อ

การจัดการ: H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทางตาของวา H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว P280 สวมใส่ถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/แว่นตาป้องกันดวงตา/ใบหน้าป้องกันใบหน้า P301 + P312 หากกลืนกิน: โทรหาศูนย์พิษวิทยาข้อมพพิษ/โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน: ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนทั้งหมดทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/ฝักบัว P305 + P351 + P338 หากเข้าตา: ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาทีอดคอนแทคเลนส์ถ้ากอดได้ล่ำย ล้างตาต่อไป P501 กำจัดสาร/ภาชนะรรจุตามกฎกฎข้องจังหวัดหรือแห่งชาติและในประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

การจัดเก็บ: เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทเก็บให้ห่างจากแสงอาทิตย์ ความร้อน และเปลวไฟ อุณหภูมิการจัดเก็บ: < 30ºC

ส่วนประกอบ: 100 ก. ประกอบด้วย เบนซาโคเนียม คลอไรด์ 30 ก. สารเสริม และน้ำ

UK (Українська)

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ: Cavex ImpreSafe є концентрованим засобом для дезінфекції та очистки зубних відбитків, виготовлених із альгінатів, поліефірів, полісульфідів, А-силікону та С-силікону. Cavex ImpreSafe не порушує стабільність форми зубних відбитків. Не містить альдегідів.

ЦІЛЬОВІ КОРИСТУВАЧІ: Продукт призначений для використання стоматологами та фахівцями сфери охорони здоров'я, які мають знання щодо процедур дезінфекції медичних виробів. Продукт не можна застосовувати безпосередньо в пацієнтів.

СПЕКТР ДІЇ: Бактерицидна дія (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% за 3 хв; протигрибкова дія (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% за 3 хв; оболонкові віруси (EN 17111:2018^) 3% за 3 хв

^ Випробувано за низького навантаження по органічним сполукам / * Випробувано за високого навантаження по органічним сполукам / ^ Випробувано за низького та високого навантаження по органічним сполукам

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Задля власної безпеки надягніть одноразові рукавички та захисні окуляри. Приготуйте робочий розчин відповідно до таблиці дозування. Повністю занурте зубний злепок і ложку для злепків у дезінфікуючий засіб. Дотримуйтеся вказаного щодо часу впливу (не перевищуйте його). Після дезінфекції ретельно промийте злепки під проточною водою принаймні якістю питної протягом 10 секунд. Замініть робочий розчин щодня або в разі його помітного забруднення. Перелік сумісних і несумісних матеріалів доступний на нашому сайті. Якщо ви не впевнені щодо складу матеріалу медичного виробу, перед використанням зв'яжіться з виробником. Інформація про всі серйозні інциденти, що трапилися відносно Медичного Виробу, повинна надаватися виробнику чи компетентному органу.

ОБМЕЖЕННЯ: ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Не використовуйте для обробки інвазивних медичних виробів. Не змішуйте з іншими засобами. Перед дезінфекцією переконайтеся, що видалено всі видимі забруднення.

ПОВОДЖЕННЯ: H302 Шкідливо при проковтуванні. H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей. H410 Дуже токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками. P280 Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/обличчя. P301 + P312 У РАЗІ КОВТАННЯ: подзвонити до ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ або лікарю/терапевту, якщо Ви погано себе почуваєте. P301 + P330 + P331 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: Промити рот. НЕ викликати блювоту. P303 + P361 + P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою [або під душем]. P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання. P501 Утилізувати вміст/упаковку відповідно до місцевих і національних законодавства. Додаткову інформацію див. у паспорті безпеки на нашому сайті.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігайте в прохолодному, сухому та добре провітрюваному приміщенні. Берегти від прямих сонячних променів, високих температур і відкритого вогню. Температура зберігання: < 30 °C

СКЛАД: У 100 грамах міститься 30 грамів хлориду бензалконію, допоміжні речовини та вода.

ZH-CN (简体中文)

预期目的: Cavex ImpreSafe 是一种浓缩剂，用于海藻酸盐、聚醚、聚硫化物，加成式矽胶和缩合式矽胶制成的牙科印模的消毒和清洁。Cavex ImpreSafe 不会影响牙印模的尺寸稳定性。不含醛类。

目标用户: 本产品供具有医疗器械消毒知识的牙科或医护人员使用。本产品不得直接用于患者。

有效范围: 灭活细菌的 (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% 3分钟; 灭活酵母菌的 (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% 3分钟; 包膜病毒 (EN 17111:2018^) 3% 3分钟

^ 在低机负荷下测试 / * 在高机负荷下测试 / ^ 在低机负荷和高机负荷下测试

使用说明: 戴上一次性手套和防护镜以自我防护。按照剂量表准备工作溶液。将牙印模和印模盘完全浸入消毒液中。遵照但不要超过规定的接触时间。消毒后，用至少饮用质量的流动水彻底冲洗印模10秒钟。每天更换工作溶液，或在明显污染时更换。可在本公司网站上查阅兼容和不兼容材料的清单。如果您对医疗设备的材料成分不确定，请在使用前联系制造商。所有与医疗设备有关的严重事故都应报告给制造商或主管部门。

限制: 仅供专业使用。不可用于侵入性医疗设备。请勿与其他产品混合使用。消毒前要确保所有可见的污垢都已被清除。

处理: H302 吞食有害。H314 造成严重皮肤灼伤和眼睛损伤。H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影響。P280 穿戴防護手套/防護衣/防護眼罩/防護面具。P301 + P312 如果感覺不適，呼叫毒物咨询中心或向医师/内科医生咨询。P301 + P330 + P331 如誤吞咽: 漱口。切勿催吐。P303 + P361 + P353 如皮膚（或頭髮）沾染: 立即脫掉所有受沾染的衣服。用水清洗皮膚/淋浴。P305 + P351 + P338 如進入眼睛: 用水小心冲洗幾分鐘。如戴隐形眼鏡並可方便地取出, 取出隐形眼鏡。繼續冲洗。P501 依地方/區域/國家/國際規定處置內裝物/貨箱。更多信息, 請參考我们网站上的安全數據表。

储存: 储存在陰涼、干燥和通风良好的设施中。避免阳光直射、高温和明火。储存温度: < 30ºC

成分: 100克含30克苯扎氯铵、助剂和水。

EFFECTIVE SPECTRUM

Bactericidal	3% in 3 min
Antibiotic-resistant bacteria	3% in 3 min
Yeasticidal	3% in 3 min
Antibiotic-resistant yeasts	3% in 3 min
Virucidal against enveloped viruses	3% in 3 min
Bovine viral diarrhea virus (BVDV)	3% in 3 min
Coronavirus	3% in 3 min
Hepatitis B virus	3% in 3 min
Hepatitis C virus	3% in 3 min
Herpes simplex virus	3% in 3 min
Human immunodeficiency virus (HIV)	3% in 3 min
Influenza A virus	3% in 3 min
Vaccinia virus	3% in 3 min

PL (Polski)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE: Cavex ImpreSafe jest koncentratem do dezynfekcji i czyszczenia wycisków stomatologicznych, Cayoh wykonanych z mas alginatowych, polieterowych, polisulfidowych, A-silikonowych i C-silikonowych. Środek Cavex ImpreSafe nie wpływa na stabilność wymiarową wycisków i modeli gipsowych. Nie zawiera aldehydów.

DOCELOWI UŻYTKOWNICY: Produkt jest przeznaczony do użycia przez pracowników z branży dentystycznej lub służby zdrowia posiadających kompetencje związane z dezynfekcją urządzeń medycznych. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

SPEKTRUM DZIAŁANIA: Bakteriobójcza (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% w 3 min.; drożdżobójcza (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% w 3 min.; wirusy otoczkowe (EN 17111:2018^) 3% w 3 min.

^ Testowany pod niskim obciążeniem organicznym / * Testowany pod dużym obciążeniem organicznym / ^ Testowany pod niskim i wysokim obciążeniem organicznym

INSTRUKCJA UŻYWANIA: Ze względów bezpieczeństwa nosić rękawice ochronne jednorazowego użytku i okulary ochronne. Przygotować roztwór roboczy zgodnie z tabelą dawkowania. Całkowicie zanurzyć wycisk stomatologiczny i łyżkę wyciskową w środku dezynfekującym. Przestrzegać czasu kontaktu, ale go nie przekraczać. Po dezynfekcji dokładnie przepłukać wyciski pod bieżącą wodą o jakości co najmniej wody pitnej przez 10 sekund. Roztwór roboczy należy wymieniać codziennie lub w przypadku widocznego zanieczyszczenia. Lista kompatybilnych i niekompatybilnych materiałów jest dostępna na naszej stronie internetowej. W przypadku braku pewności co do składu materiałowego wyrobu medycznego, przed użyciem należy skontaktować się z producentem. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

OGRANICZENIA: TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. Nieprzeznaczone do stosowania na inwazyjnych urządzeniach medycznych. Nie mieszać z innymi produktami. Przed dezynfekcją należy upewnić się, że wszystkie widoczne zabrudzenia zostały usunięte.

OBSŁUGA: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu / ochronę twarzy. P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUć lub z lekarzem. P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/przyrzucem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI

EN (English)

INTENDED PURPOSE: Cavex ImpreSafe is a concentrate for the disinfection and cleaning of dental impressions made of alginate, polyether, polysulfide, A-silicone, and C-silicone. Cavex ImpreSafe does not affect the dimensional stability of dental impressions. Free of aldehydes.

INTENDED USERS: The product is intended for use by dental healthcare professionals with knowledge about the disinfection of medical devices. The product is not to be used directly on patients.

EFFECTIVE SPECTRUM: Bactericidal (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% in 3 min; yeasticidal (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% in 3 min; virucidal against enveloped viruses (EN 17111:2018^) 3% in 3 min
^ Tested under low organic load / * Tested under high organic load / * Tested under low and high organic load

INSTRUCTIONS FOR USE: For your protection, wear disposable gloves and safety goggles. Prepare the working solution according to the dosing table. Immerse dental impression and impression tray completely in the disinfection solution. Adhere to the but do not exceed indicated contact time. After disinfection, rinse impressions thoroughly under running water of at least drinking quality for 10 seconds. Replace working solution daily or when visibly contaminated. A list of compatible and incompatible materials is available on our website. If you are uncertain as to the material composition of the medical device, contact the manufacturer before use. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

LIMITATIONS: FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Not for use on invasive medical devices. Do not mix with other products. Make sure that all visible soiling has been removed before disinfection.

HANDLING: H302 Harmful if swallowed. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P301 + P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P301 + P330 + P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P501 Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations. For more information, please refer to Safety Data Sheet available on our website.

STORAGE: Store in cool, dry and well-ventilated facility. Keep out from direct sunlight, heat, and open flame. Storage temperature: < 30°C

COMPOSITION: 100 g contains 30 g benzalkonium chloride, auxiliaries and water.

BG (български)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Cavex ImpreSafe е концентрат за дезинфекция и почистване на зъболекарски отливки, изработени от алгинат, полиетер, полисулфид, А-силикон и С-силикон. Cavex ImpreSafe не прави на пространствената стабилност на зъболекарските отливки. Без алдехиди.

ЦЕЛЕВИ ПОТРЕБИТЕЛИ: Продуктът е предназначен за употреба от дентални и здравни специалисти с познания относно дезинфекцията на медицинските изделия. Продуктът не трябва да се използва директно при пациенти.

СПЕКТЪР НА ЕФЕКТИВНОСТ: Бактерицидно (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% за 3 мин.; дрождащо (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% за 3 мин.; вирусен с обвивка (EN 17111:2018^) 3% за 3 мин.
^ Тестван при ниско органично натоварване / * Тестван при високо органично натоварване / * Тестван при ниско и високо органично натоварване

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Носете ръкавици за еднократна употреба и предпазни очила за Ваша защита. Подгответе работния разтвор съгласно таблицата за дозиране. Потопете зъболекарската отливка и отпечатъчната лъжица напълно в дезинфекциращия разтвор. Съблюдавайте необходимото за въздействие време, без да го превишавате. След дезинфекцията промийте отливките обилно с течаща питейна вода за 10 секунди. Сменяйте работния разтвор ежедневно или при видимо замърсяване. На пазара уебстраница можете да намерите списък със съвместими и несъвместими материали. Ако не сте сигурни за материалния състав на медицинското изделие, свържете се с производителя преди употреба. Всяко сериозно инцидентно, възникнали във връзка с медицинското устройство, трябва да се докладват на производителя и на компетентния орган.

ОГРАНИЧЕНИЯ: САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. Не се прилага при инвазивни медицински изделия. Не смесвайте с други продукти. Уверете се, че всички видими замърсявания са отстранени преди дезинфекция.

РАБОТА: H302 Вреден при поглъщане. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготрайен ефект. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ОТРОВНИ ЦЕНТЪР или на лекар при неразположение. P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ НА ХРАНАТА. P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Обилно изкапете с водоразтворена. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P501 Изхвърляйте съдържанието/контейнера в съответствие с местните и национални разпоредби. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност, достъпен на нашия уебсайт.

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветрено място. Да се пази от пряка слънчева светлина, топлина и открити пламъци. Температура на съхранение: < 30 °C.

СЪСТАВ: 100 g съдържат 30 g benzalkonium chloride, помощни вещества и вода.

DA (Dansk)

TILSIGTET FORMÅL: Cavex ImpreSafe er et koncentrat til desinfektion og rengøring af dentale aftryk fremstillet af alginat, polyether, polysulfid, A-silikon og C-silikone. Cavex ImpreSafe påvirker ikke dimensionsstabilitet af dentale aftryk. Fri for aldehyd.

TILSIGTEDE BRUGERE: Produktet er beregnet til brug af tandplejepersonale med viden om desinfektion af medicinsk udstyr. Produktet må ikke anvendes direkte på patienter.

VIRKESPEKTRUM: Bakteridræbende (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% A 3 min; gærsvampdræbende (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% på 3 min; kappekledte virus (EN 1711:2018^) 3% på 3 min
^ Testet med organisk belastning / * Testet under høj organisk belastning / * Testet under lav og høj organisk belastning

BRUGSANVISNING: Bevar din egensundhed og beskyttelsesbriller for din egen beskyttelse. Forbered opløsningen i henhold til doseringstabellen. Nedsænk dentale aftryk og dentale aftrykskeer komplet i den desinficerende opløsning. Overhold men overskrid ikke kontaktidet. Efter desinfektion skylles instrumenter grundigt under lubende vand, der som minimum er af drikkekvalitet, i 10 sekunder. Udskift opløsningen dagligt, eller når den er synligt kontamineret. En liste over kompatible og inkompatible materialer kan findes på vores hjemmeside. Hvis du er usikker på materialesammensætningen af det medicinske udstyr, skal du kontakte producenten inden brug. Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, bør indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

BEGRÆNSNINGER: KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. Ikke til brug på invasivt medicinsk udstyr. Ikke blandes med andre produkter. Sørg for, at al synlig tilsmudsning er fjernet inden desinfektion.

HÅNDTERING: H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt tøj/brus huden med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter. For mere information henvises til sikkerhedsdatabladet, der er tilgængeligt på vores websted.

OPBEVARING: Opbevares på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra direkte solstråler, varme og åben ild. Opbevaringstemperatur: < 30 °C

SAMMENSÆTNING: 100 g indeholder 30 g benzalkoniumchlorid, hjælpestoffer og vand.

DE (Deutsch)

ZWECKBESTIMMUNG: Cavex ImpreSafe ist ein Konzentrat für die Desinfektion und Reinigung von zahnärztlichen Abformungen aus Alginat, Polyether, Polysulfid, A-Silikon und K-Silikon. Cavex ImpreSafe hat keinen Einfluss auf die Formstabilität von Abformungen aus Alginat, Polyether, Polysulfid, A-Silikon und K-Silikon.

VORGESehene ANWENDER: Das Produkt ist für die Verwendung durch professionelle Fachkräfte im zahnmedizinischen oder gesundheitlichen Bereich mit Kompetenzen für den Desinfektionsprozess von Medizinprodukten bestimmt. Das Produkt ist nicht für die direkte Verwendung am Patienten bestimmt.

WIRKSPEKTRUM: Bakteriziden (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% in 3 Min.; levurozid (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% in 3 Min.; virusid gegen behüllte Viren (EN 17111:2018^) 3% in 3 Min.
^ Getested unter geringer organischer Belastung / * Getested unter hoher organischer Belastung / * Getested unter geringer und hoher organischer Belastung

GEBRAUCHSANWEISUNG: Zum Selbstschutz Einweghandschuhe und Schutzbrille tragen. Gebrauchslösung gemäss Dosiertabelle ansetzen. Zahnärztliche Abformungen vollständig in der Desinfektionslösung eintauchen. Angegebene Einwirkzeit einhalten aber nicht überschreiten. Abformungen nach der Desinfektion gründlich mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität, 10 Sekunden lang spülen. Gebrauchslösung täglich neu ansetzen und bei sichtbarer Verschmutzung entsprechend früher wechseln. Eine Liste kompatibler und inkompatibler Materialien ist auf unserer Webseite verfügbar. Wenn Sie hinsichtlich der Materialzusammensetzung des Medizinprodukts Fragen haben, wenden Sie sich vor der Verwendung an den Hersteller des Medizinprodukts. Alle im Zusammenhang mit Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden sind.

EINSCHRÄNKUNGEN: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. Nicht für invasive Medizinprodukte geeignet. Nicht mit anderen Produkten mischen. Stellen Sie sicher, dass alle sichtbaren Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernt wurden.

HANDHABUNG: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz. P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCK: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokaler/nationaler Vorschriften der Entsorgung zuführen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.

LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und offener Flamme schützen. Lagertemperatur: < 30°C.

ZUSAMMENSETZUNG: 100 g enthalten 30 g benzalkoniumchlorid, Hilfsstoffe und Wasser.

EL (Ελληνικά)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Το Cavex ImpreSafe είναι ένα συμπυκνωμένο διάλυμα για την απολύμανση και τον καθαρισμό των οδοντιατρικών αποτυπωμάτων κατασκευασμένα από αλγινικό, πολυαιθέρα, πολυσουλφίδιο, σιλικόνη-Α και σιλικόνη-C. Το Cavex ImpreSafe δεν επηρεάζει τη σταθερότητα των διαστάσεων των οδοντιατρικών αποτυπωμάτων. Δεν περέχει αλδεΰδες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ: Το προϊόν προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες στον χώρο της οδοντιατρικής ή περίθαλψης υγείας με γνώσεις για την απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί απευθείας στους ασθενείς.

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Βακτηριοκτόνο (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% σε 3 λ.; ζυμομυκητοκτόνο (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% σε 3 λ.; ιοί με έλυτρο (EN 17111:2018^) 3% σε 3 λ.
^ Δοκιμάστηκε με χαμηλό οργανικό φορτίο / * Δοκιμάστηκε με χαμηλό οργανικό φορτίο / * Δοκιμάστηκε με χαμηλό και υψηλό οργανικό φορτίο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για την ατομική σας προστασία, φορέτε γάντια μιας χρήσης και γυαλιά προστασίας. Προετοιμάστε το διάλυμα εργασίας σύμφωνα με τον πίνακα δοσολογίας. Βυθίστε τελείως τα οδοντικά αποτυπώματα και το δισκάριο αποτυπώσης στο απολυμαντικό διάλυμα. Τηρείτε αλλά μην υπερβαίνετε τον υποδεικνύμενο χρόνο επαφής. Μετά την απολύμανση, ξεπλύνετε καλά τα αποτυπώματα κάτω από τρεχούμενο νερό τουλάχιστον ποιότητας πόσιμου για 10 δευτερόλεπτα. Αντικαθιστάτε τον εργασιακό διάλυμα καθημερινά ή όταν είναι ορατά μολυσμένο. Μια λίστα με συμβατά και μη συμβατά υλικά είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Εάν δεν είστε βέβαιοι ως προς τη σύνθεση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή πριν από τη χρήση. Να αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Να μη χρησιμοποιείται σε επεμβατικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Μην αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Βεβαιωθείτε ότι το ορατό λύμα έχει πλύνει καθώς αφαιρεθεί πριν από την απολύμανση.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H314 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρούχο/προστασία ματιών/προστασία για τα μάτια / πρόσωπο. P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή κάλεστε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/ντουζιέρα. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέχη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύετε σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τη θερμότητα και την ανοιχτή φλόγα. Θερμοκρασία αποθήκευσης: < 30°C

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100 g περιέχουν 30 g χλωριούχο βενζαλκόνιο, βοηθητικά και νερό.

FA (فارسی)

کاربرد مورد نظر: Cavex ImpreSafe یک کنسانتره برای گندزدایی و میرزدایی قیپ‌های دندان‌پزشکی ساخته شده از آلژینات، پلی‌اتر، پلی‌سولفید، سیلیکون-A و سیلیکون-C است. Cavex ImpreSafe بر ثبات قیپ‌های دندان‌پزشکی بی‌تأثیر است و عاری از ترکیبات آلدهیدی می‌باشد.

کاربران مورد نظر: این محصول جهت استفاده توسط متخصص دندان‌پزشکی یا بهداشتی درمانی با دانش درباره گندزدایی وسایل پزشکی در نظر گرفته شده است. این محصول نباید مستقیماً بر روی بیماران استفاده شود.

طیف کارآیی: باکتری‌کش (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) ۳٪ در ۳ دقیقه؛ مخمرکش (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) ۳٪ در ۳ دقیقه؛ ویروس‌های پوشش‌دار (EN 17111:2018^) ۳٪ در ۳ دقیقه
^ تست شده تحت بار آلی پایین / * تست شده تحت بار آلی بالا / * تست شده تحت بار آلی پایین و بالا

دستورالعمل استفاده: برای محافظت خود از دستکش‌های یکبار مصرف و عینک محافظ استفاده کنید. محلول مورد نیاز را مطابق با جدول دوز آماده کنید. قیپ‌های دندان‌پزشکی و سینی ایمپرشن را به طور کامل در محلول گندزدایی غوطه‌ور کنید. زمان اثرگذاری مجاز را رعایت کنید اما از آن فراتر نروید. پس از گندزدایی، ایمپرشن‌ها را به طور کامل با آب جاری با کیفیت آشامیدنی به مدت ۱۰ ثانیه بشویید. محلول عمل شده را به صورت روزانه یا هنگام مشاهده آلوده شدن آن جایگزین کنید. لیستی از مواد سازگار و غیرسازگار در وبسایت ما ارائه شده است. اگر در خصوص ترکیب مواد سازنده وسیله پزشکی اطمینان ندارید، قبل از مصرف این محصول با شرکت سازنده تماس بگیرید. تمام حوادث جدی که در ارتباط با وسیله پزشکی پیش می‌آید باید به سازنده آن یا سازمان مسئول گزارش داده شود.

محدودیت‌ها: تنها جهت استفاده توسط متخصصین. برای استفاده روی وسایل پزشکی تهاجمی در نظر گرفته نشده است. با سایر محصولات ترکیب نکنید. قبل از گندزدایی مطمئن شوید همه کثیفی‌های قابل مشاهده پاک شده باشند.

عمل: H302 در صورت بلعیدن زیانآور است. H314 باعث سوختگی شدید پوست و آسیب به چشم می‌شود. H410 برای حیات آبزیان بسیار سمی است و عوارض جانگذری را در طی می‌گذارد. P280 دستکش محافظ/لباس محافظ/عینک محافظ/صورت محافظ/محافظ چشم را بپوشید. P301 + P312 در صورت بلعیدن: تماس با یک مرکز مسمومیت یا پزشک گیاهی بگیرید. P301 + P330 + P331 در صورت بلعیدن: دهان را آب بشویید. برای آوردن استفراغ تلاش نکنید. P303 + P361 + P353 در صورت تماس با پوست (یا مو): کلیه لباس‌های آلوده را جدا کنید/در بیاورید. پوست را زیر آب/دوش بشویید. P305 + P351 + P338 در صورت تماس با چشم: چندین دقیقه با احتیاط زیر آب بشویید. در صورت داشتن لنز، اگر ببرون آوردن آنها سخت نیست آنها را خارج کنید. به شستشوی خود ادامه دهید. P501 دفع محتوا/ظرف با مقررات ملی و محلی مطابق دفع کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی موجود در وبسایت ما مراجعه کنید.

نگهداری: در یک محل خنک، خشک و با تهویه مناسب نگهداری شود. دور از معرض نور مستقیم، منابع حرارتی و شعله آشکار نگه داشته شود. دمای **نگهداری:** کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد.

ترکیب: هر ۱۰۰ گرم محتوی ۳۰ گرم بنزالکونیوم کلراید، افزودنی‌های مجاز و آب است.

FR (Français)

USAGE PRÉVU : Cavex ImpreSafe est un concentré pour la désinfection et le nettoyage des empreintes dentaires en alginate, polyéther, polysulfure, silicone A et silicone C. Cavex ImpreSafe n'affecte pas la stabilité dimensionnelle des empreintes dentaires. Sans aldéhydes.

UTILISATEURS VISÉS : Le produit est prévu pour une utilisation par des professionnels dentaires ou de la santé possédant des connaissances concernant la désinfection des dispositifs médicaux. Le produit ne doit pas être utilisé directement sur les patients.

SPECTRE D'EFFICACITÉ : Bactéricide (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% en 3 min ; levuricide (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% en 3 min ; virus enveloppés (EN 17111:2018^) 3% en 3 min
^ Testé sous faible charge organique / * Testé sous charge organique élevée / * Testé sous charge organique faible et élevée

NOTICE D'UTILISATION : Pour votre protection, portez des gants jetables et des lunettes de sécurité. Préparer la solution active conformément au tableau de dosage. Immerger complètement l'empreinte dentaire et le porte-empreinte dans la solution désinfectante. Respecter mais ne pas dépasser le temps de contact indiqué. Après la désinfection, rincer les empreintes abondamment sous l'eau courante d'au moins une qualité d'eau potable pendant 10 secondes. Remplacer la solution active tous les jours ou lorsqu'elle est visiblement contaminée. Une liste des matériaux compatibles et incompatibles est disponible sur notre site web. Si vous ne savez pas sûr de la composition du matériau du dispositif médical, contactez le fabricant avant utilisation. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

LIMITES : POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT. Ne convient pas aux dispositifs médicaux invasifs. Ne pas mélanger avec d'autres produits. S'assurer que toute contamination visible a été éliminée avant la désinfection.

MANIPULATION : H302 Nocif en cas d'ingestion. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P312 EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS provoquer le vomissement. P303 + P361 + P353 EN CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/la douche. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes si elles sont faciles à enlever et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur notre site web.

STOCKAGE : Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil, de la chaleur et des flammes nues. Température de stockage : < 30°C.

COMPOSITION : 100 g contiennent 30 g de chlorure de benzalconium, des auxiliaires et de l'eau.

HU (Magyar)

RENDELTETÉS: Az Cavex ImpreSafe egy koncentrátum, amely az alginátból, polléterből, poliszulfidból, A-szilikonból és C-szilikonból készült fogászati lenyomatok fertőtlenítésére alkalmas. Az Cavex ImpreSafe nem befolyásolja a fogászati lenyomatok dimenziós stabilitását. Aldehidmentes.

CÉLZOTT FELHASZNÁLÓK: A terméket fogászati egészségügyben és szakemberekben szánták, akik tudással rendelkeznek az orvosi eszközök fertőtlenítésével kapcsolatosan. A termék nem alkalmazható közvetlenül a betegeken.

HATÁSSPEKTRUM: Baktericida (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% per 3 min.; mielicidinis (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% per 3 min.; vírusok az burkolt vírusok ellen (EN 17111:2018^) 3% per 3 min
^ Állandóan ezaz maszkolt organizmus mellett / * Állandóan ezaz maszkolt organizmus mellett és ritka szervezetek mellett

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: A biztonságra érdekelben viseljen egyszer használatos kesztyűt és védőszemüveget. A használandó oldalat az adagolási táblázatnak megfelelően készítse el. Merítse be a fogászati lenyomatot és a lenyomattálcát teljesen az oldatba. Tartsa be, de ne lépje túl a megadott behatási időt. Fertőtlenítés utána alaposan öblítse le a lenyomatokat legalább ivó minőségű folyóvíz alatt 10 másodpercig. Naponta, vagy ha láthatóan szennyezett, akkor azonnal cserélje le az oldatot. Az összeférhető és az összeférhetetlen anyagok listája elérhető a weboldalunkon. Ha nem biztos az orvostechnikai eszköz anyagi összetételében, használat előtt forrassa le a gyártóval. Az esetközzel kapcsolatban előfordult súlyos váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg telepedett helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

KORLÁTOZÁSOK: KIZÁRÓLAG SZAKEMBER ÁLTALI HASZNÁLATRA. Nem alkalmazható invazív orvostechnikai eszközökhöz. Ne keverje össze más termékekkel. Győződjön meg arról, hogy a fertőtlenítés előtt minden szennyeződést eltávolított.

KEZELÉS: H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élőlényekre, hosszan tartó károsodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: forduljon orvosi segítséghez a POISON CENTER vagy orvoshoz. P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hányást okozni. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS: Több percen át tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 Az edény/tartály megsemmisítése a helyi és/vagy az egyéb országos szabályozásokkal összhangban. További információért kérjük fel a weboldalunkon elérhető biztonsági adatlapot.

TÁROLÁS: Hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tartsa távol közvetlen napfénytől, hőtől és nyílt lángtól. Tárolási hőmérséklet: <30°C

ÖSSZETÉTEL: 100 g oldat 30 g benzalkónium-klorid, segédanyagokat és vizet tartalmaz.

IT (Italiano)

DESTINAZIONE D'USO: Cavex ImpreSafe è un concentrato per la disinfezione e la pulizia di impronte dentali in alginato, polietere, polisolfuro, silicone A e silicone C. Cavex ImpreSafe non altera la stabilità dimensionale delle impronte dentali. Privo di aldeidi.

UTILIZZATORI PREVISTI: Il prodotto è destinato a essere utilizzato da odontoiatri o operatori sanitari con competenze nel processo di disinfezione di dispositivi medici. Il prodotto non deve essere usato direttamente sui pazienti.

SPETTRO D'AZIONE: Battericida (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% per 3 min.; mielicidinis (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% per 3 min.; virus con involucro (EN 17111:2018^) 3% per 3 min.
^ Ibbandytas esaurit mabrur organiku medžiagų kiekiui / * Ibbandytas esant didieliam organiniu medžiagų kiekiui / * Ibbandytas esant mažam ir dideliam organiniu medžiagų kiekiui

ISTRUZIONI PER L'USO: Per la protezione della propria persona, indossare guanti monouso e occhiali protettivi. Preparare la soluzione di lavoro in base alla tabella di dosaggio. Immergere completamente l'impronta dentale e il portaimpronta nella soluzione disinfettante. Rispettare ma non superare il tempo di esposizione indicato. Dopo la disinfezione, risciacquare le abbondanti impronte in acqua sotto acqua corrente di qualità almeno analoga all'acqua potabile per 10 secondi. Sostituire la soluzione di lavoro ogni giorno o se visibilmente contaminata. Un elenco di materiali compatibili e incompatibili è disponibile sul nostro sito web. In caso di dubbi sulla composizione materiale del dispositivo medico, contattare il produttore prima dell'uso. Segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

LIMITAZIONI: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Non utilizzabile su dispositivi medici invasivi. Non mescolare con altri prodotti. Assicurarsi che tutto lo sporco visibile sia stato rimosso prima della disinfezione.

MANIPOLAZIONE: H302 Nocivo se ingerito. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301 + P312 IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o di capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è facile farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale e nazionale. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito web.

IMMAGAZZINAMENTO: Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere lontano dalla luce solare diretta, dal calore e da fiamme libere. Temperatura di conservazione: <30 °C

COMPOSIZIONE: 100 g contengono 30 g di benzalconio cloruro, materiali ausiliari e acqua.

LT (Lietuviešu)

NUMATYTA PASKIRTIS: Cavex ImpreSafe yra koncentratas, skirtas dantų atspaudų, pagamintų iš alginato, polieterio, polisulfido, A-silikono ir K-silikono, dezinfekavimui ir valymui. Cavex ImpreSafe neturi įtakos dantų atspaudų arba gipsinių modelių matmenų stabilumui. Skysčio sudėtyje nėra aldehidų.

NUMATYTI VARTOTOJAI: Produktas skirtas naudoti dirbtų ir medicininės priežiūros specialistams, išmanantiems medicininių prietaisų dezinfekavimo. Produkto naudoti tiesiogiai pacientams negalima.

EFEKTYVUS SPEKTRAS: Baktericidinis (EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*) 3% per 3 min.; mielicidinis (EN 13624:2013*, EN 14562:2006*) 3% per 3 min.; virusai su apvalkalu (EN 17111:2018^) 3% per 3 min.
^ Ibbandytas esant mažam organiniu medžiagų kiekiui / * Ibbandytas esant didieliam organiniu medžiagų kiekiui / * Ibbandytas esant mažam ir didieliam organiniu medžiagų kiekiui

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: Apsaugai dėvėkite vienkartines pirštines ir apsaugines akinius. Paruoškite darbinį tirpalą pagal dozavimo lentelę. Visiškai panirkite dantų atspaudą ir atspaudų dėklą. Laikykitės veikimo laiko nurodymų ir jo neviršykite. Po dezinfekcijos instrumentus kruopščiai 10 sekundžių nuplaukite vandeniu, kurio kokybė atitinka bent geriamojo vandens kokybę. Tirpalą keiskite kasdien arba kai yra matomas jo užterštumas. Su alkoholiu sudėtingai fertėmi arba nesuderinami medžiagų sąrašas pateiktas mūsų interneto svetainėje. Jei nesate tikri dėl medicininio prietaiso sudėtinių medžiagų, prieš naudojimą kreipkitės į gamintoją. Bet kokia rimta incidentas, kurio metu prietaisas buvo naudojamas ir nesaderėjęs materialiem, ja neesat droši par to, no kādēm materiāliem ir izgatavots medicīniskā ierīce, pirms lietošanas sazinieties ar ražotāju. Jebkads nopietns ar ierīci saistīts negadījums būtu jāpaziņo ražotājam un kompetentajai valsts dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs vai uzņēmējdarbību un/vai dzīvo pacients.

**IERobEŽOJU